

Reduzca su riesgo de infección relacionada con la quimioterapia con 1 de 3 opciones de administración

 **UDENYCA**[®]
pegfilgrastim-cbqv
Injection 6 mg/0.6 mL

EN EL HOGAR



APOYO PARA EL SISTEMA INMUNITARIO QUE

SOBRE LA MARCHA



EN EL CONSULTORIO



SE ADAPTA A SU VIDA

UDENYCA OFRECE OPCIONES DE ADMINISTRACIÓN QUE SATISFACEN SUS NECESIDADES

¿Qué es UDENYCA[®]?

UDENYCA es un medicamento con receta médica que se usa para ayudar a reducir la probabilidad de infección debido a un recuento bajo de glóbulos blancos, en personas con determinados tipos de cáncer (no mieloides) que reciben medicamentos contra el cáncer (quimioterapia) que pueden causar fiebre y un recuento de células sanguíneas bajo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No use UDENYCA si ha tenido una reacción alérgica grave a los medicamentos de pegfilgrastim o filgrastim.

Consulte la **Información importante de seguridad adicional en todo este folleto** y **haga clic para obtener la Información para el paciente y la Información de prescripción.**


UDENYCA puede ayudar a apoyar a su sistema inmunitario mientras recibe quimioterapia

LA QUIMIOTERAPIA PUEDE DISMINUIR SU RECUENTO DE GLÓBULOS BLANCOS

La quimioterapia puede ayudar a detener el crecimiento de las células cancerosas, pero también puede reducir el recuento de glóbulos blancos. Un recuento bajo de glóbulos blancos puede ponerlo en riesgo de sufrir una infección y una complicación llamada neutropenia febril, que es grave y puede retrasar sus tratamientos de quimioterapia.

UDENYCA POTENCIA EL CRECIMIENTO DE SUS GLÓBULOS BLANCOS

UDENYCA aumenta el recuento de glóbulos blancos, lo que puede ayudar a su cuerpo a combatir las infecciones y prevenir la neutropenia febril.



LOS EFECTOS SECUNDARIOS MÁS FRECUENTES DE UDENYCA



**DOLOR EN LOS
HUESOS**



**DOLOR EN LOS
BRAZOS**



**DOLOR EN LAS
PIERNAS**

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de UDENYCA. Consulte la Información importante de seguridad de este folleto y póngase en contacto con su equipo de atención médica para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios o las inquietudes que pueda tener sobre su tratamiento. Juntos pueden decidir cuál es la mejor forma de controlar los efectos secundarios para permanecer en el camino correcto con su tratamiento.

Consulte la Información importante de seguridad en todo este folleto.

¿Cómo sabré si tengo una infección?

ES IMPORTANTE TOMARSE LA TEMPERATURA

La fiebre es un signo de infección. Comuníquese con el equipo de atención médica inmediatamente si tiene fiebre de 100.4 °F (38.0 °C) o más. Tómese la temperatura cada vez que no se sienta bien o según lo recomendado por su equipo de atención médica.

Otros signos de infección son escalofríos, falta de aire, dolor de garganta, rigidez del cuello y ardor o dolor al orinar. Hable con su equipo de atención médica sobre los signos a los que debe estar atento.

Si tiene fiebre, se trata de una emergencia médica y debe comunicarse inmediatamente con su equipo de atención médica o ir a la sala de emergencias de su hospital local.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de UDENYCA?

UDENYCA puede causar efectos secundarios graves, como los siguientes:

- **Rotura del bazo:** el bazo puede agrandarse y romperse. Un bazo roto puede causar la muerte. Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si tiene dolor en la zona superior izquierda del estómago o en el hombro izquierdo.
- **Un problema pulmonar grave llamado síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA):** comuníquese con su proveedor de atención médica o busque atención de emergencia de inmediato si tiene falta de aire con o sin fiebre, dificultad para respirar o una frecuencia rápida de respiración.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo este folleto y haga clic para obtener la [Información para el paciente](#) y la [Información de prescripción](#).



Escanee o haga clic a continuación para **VISITAR UDENYCA.COM** para obtener más información sobre su tratamiento



El autoinyector precargado UDENYCA

Tratamiento en la comodidad de su hogar*



Administra el medicamento en menos de 10 segundos[†]

* También puede administrarlo su proveedor en su consultorio.

[†] Consulte las [Instrucciones de uso](#) antes de administrar UDENYCA.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de UDENYCA? (continuación)

- **Reacciones alérgicas graves:** UDENYCA puede causar reacciones alérgicas graves. Estas reacciones pueden causar erupción cutánea en todo el cuerpo, falta de aire, sibilancias, mareos, hinchazón alrededor de la boca o los ojos, ritmo cardíaco acelerado y sudoración. **Si tiene alguno de estos síntomas, deje de usar UDENYCA y comuníquese con su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de emergencia de inmediato.**
- **Crisis drepanocíticas:** es posible que tenga una crisis drepanocítica grave si tiene una anemia drepanocítica y recibe UDENYCA. Se han producido crisis drepanocíticas graves en personas con anemia drepanocítica que reciben pegfilgrastim, que a veces han provocado la muerte. Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si tiene síntomas de crisis drepanocítica, como dolor o dificultad para respirar.

Haga clic [aquí](#) o escanee el código QR para **VER UN VIDEO** para saber cómo administrar el medicamento con el autoinyector



Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo este folleto y haga clic para obtener la [Información para el paciente](#), la [Información de prescripción](#) y las [Instrucciones de uso](#).

Guía rápida del autoinyector UDENYCA

Su proveedor de atención médica le mostrará cómo preparar e inyectar el autoinyector UDENYCA. **Esta guía rápida no sustituye a las Instrucciones de uso.** Consúltela antes de administrar UDENYCA. Hable con su proveedor de atención médica o con su farmacéutico si tiene alguna pregunta.

Solo los adultos pueden autoinyectarse UDENYCA con el autoinyector.

ANTES DE EMPEZAR

Asegúrese de tener estos suministros preparados:

- 1 autoinyector UDENYCA
- 1 toallita con alcohol
- 1 trozo de algodón o gasa
- 1 contenedor para objetos punzocortantes aprobado por la FDA. Obtenga más información en [FDA.gov/safesharpsdisposal](https://www.fda.gov/safesharpsdisposal)


Saque el autoinyector UDENYCA del refrigerador y déjelo a temperatura ambiente 30 minutos antes de su uso.

- No caliente el autoinyector de ninguna otra forma. Por ejemplo, no lo caliente en un microondas, en agua caliente ni a la luz solar directa
- Deseche los autoinyectores que se hayan dejado a temperatura ambiente (68-77 °F) durante más de 48 horas

Revise su autoinyector y no lo use en los siguientes casos:


- El medicamento parece con cambio de color o turbio
- El medicamento contiene grumos, sedimentos o partículas
- Se ha caído, aplastado o dañado de alguna manera
- Ha caducado

ADMINISTRACIÓN DE UDENYCA




ELEGIR

Elija un lugar de inyección y límpielo con una toallita con alcohol. Manténgase a unas 2 pulgadas del ombligo si se inyecta en el abdomen. Lávese y séquese las manos.



RETIRAR

Con la tapa transparente del autoinyector hacia arriba, retire la tapa en línea recta.



PRESIONAR

Coloque el protector gris de la aguja contra la piel en un ángulo de 90°. Presione el autoinyector firmemente contra la piel y oirá el primer "clik".



SUJETAR

Siga sujetando el autoinyector firmemente contra la piel hasta que el indicador naranja deje de moverse y oiga el segundo "clik". Después de oír el segundo "clik", continúe sujetando el autoinyector en su lugar y cuente hasta 5.

Consulte la Información importante de seguridad en todo este folleto.




El inyector corporal UDENYCA

Tratamiento sobre la marcha inyectado en solo 5 minutos*



El **INDICADOR de RELLENO** negro muestra el estado de la administración de UDENYCA

La **LUZ DE ESTADO** señala si el inyector corporal funciona correctamente



ADHESIVO DE ALTA CALIDAD Y BIEN TOLERADO para una fijación segura en el cuerpo



VERDE PARPADEANTE:

EL inyector corporal funciona correctamente. **No** retire el inyector corporal si la luz de estado parpadea en verde.



VERDE LISO (O APAGADO):

Señala que la administración de la dosis ha finalizado. Compruebe si el indicador de llenado indica que está vacío.



ROJO PARPADEANTE:

Error del inyector corporal. Si oye un pitido en cualquier momento, compruebe la luz de estado. Si parpadea en rojo, comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato, ya que puede necesitar una dosis de sustitución.

* Consulte las [Instrucciones de uso](#) antes de administrar UDENYCA.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de UDENYCA? (continuación)

- **Alergias a los acrílicos (UDENYCA ONBODY™ solamente):** El inyector corporal (OBI) de UDENYCA utiliza adhesivo acrílico. Si tuvo reacciones a los adhesivos acrílicos, el uso de este medicamento puede provocar una reacción significativa.
- **Daño renal (glomerulonefritis):** UDENYCA puede causar daño renal. Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas:

- Hinchazón de la cara o los tobillos
- Sangre en la orina u orina de color oscuro
- Menos orina de lo habitual
- **Aumento del recuento de glóbulos blancos (leucocitosis):** su proveedor de atención médica analizará su sangre durante el tratamiento con UDENYCA.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo este folleto y haga clic para obtener la [Información para el paciente](#), la [Información de prescripción](#) y las [Instrucciones de uso](#).

Una guía rápida para el inyector corporal UDENYCA



El día que reciba quimioterapia, su proveedor de atención médica le aplicará el inyector corporal.



El día después de la quimioterapia, su dosis de UDENYCA se administrará automáticamente alrededor de 27 horas después de la aplicación.


Su proveedor de atención médica le explicará qué puede esperar durante el uso del dispositivo. **Esta guía rápida puede ayudarle a comprender qué esperar durante el uso del inyector corporal, pero no sustituye a las Instrucciones de uso.** Consúltelas durante el uso del inyector corporal. Hable con su proveedor de atención médica o con su farmacéutico si tiene alguna pregunta.

Haga clic **aquí** o escanee el código QR para **VER UN VIDEO** y saber qué esperar con el inyector corporal



DESPUÉS DE QUE SU PROVEEDOR APLIQUE EL INYECTOR CORPORAL UDENYCA


1



MONITOREE SU INYECTOR CORPORAL

Durante las siguientes 27 horas, compruebe ocasionalmente la luz de estado durante al menos 10 segundos. **Confirme que esté parpadeando en verde.** Si se aplica en la parte posterior del brazo, un cuidador debe estar disponible para controlar.

2



OBSERVE LA INYECCIÓN

Antes de que comience la inyección, la aguja del inyector corporal se introducirá automáticamente en la piel.

Durante la inyección, el inyector corporal parpadeará con una luz verde y rápida, y es posible que oiga que la bomba funciona. La administración de su dosis de UDENYCA llevará solo 5 minutos.

3




CONFIRME QUE LA INYECCIÓN ESTÉ COMPLETA

Cuando se haya completado la inyección, se escuchará un pitido largo, y la luz de estado se volverá de color verde liso.

Confirme que se haya completado la inyección comprobando que la luz de estado sea de color verde liso o se haya apagado.

4



ASEGÚRESE DE QUE SU INYECTOR CORPORAL ESTÉ VACÍO

No agarre el inyector corporal para intentar extraerlo del cuerpo. En su lugar, agarre el borde del adhesivo y despegue lentamente el dispositivo.

Compruebe si su inyector corporal está vacío. Debería ver una línea negra junto al indicador empty (vacío).


Si oye un pitido en cualquier momento, compruebe la luz de estado. Si parpadea en rojo, comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato. Consulte la Información importante de seguridad en todo este folleto.



La jeringa precargada de UDENYCA

Inyección administrada por su equipo de atención médica en el consultorio

Haga clic **aquí** o escanee el código QR para **OBTENER MÁS** información sobre la jeringa precargada de UDENYCA



El **PROTECTOR DE LA AGUJA** cubre la aguja y lo mantiene a salvo de los pinchazos

Un capuchón de la aguja **SIN LÁTEX** puede reducir el riesgo en las personas con sensibilidad al látex

La jeringa precargada de UDENYCA: administración confiable para más de 300,000 pacientes*

* Enero de 2019 a noviembre de 2023.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de UDENYCA? (continuación)

- **Disminución del recuento de plaquetas (trombocitopenia):** su proveedor de atención médica analizará su sangre durante el tratamiento con UDENYCA. Informe a su proveedor de atención médica si tiene una hemorragia o un moretón inusuales durante el tratamiento con UDENYCA. Esto podría ser un signo de disminución de los recuentos de plaquetas, lo que puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre.
- **Síndrome de fuga capilar:** UDENYCA puede hacer que el líquido se filtre de los vasos sanguíneos a los tejidos del cuerpo. Esta afección se denomina “síndrome de fuga capilar” (SFC). El SFC puede provocar rápidamente síntomas que pueden ser mortales. Obtenga ayuda médica de emergencia de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas:

- Hinchazón o tumefacción y orina menos de lo habitual
- Dificultad para respirar
- Hinchazón de la zona del estómago (abdomen) y sensación de saciedad
- Mareos o sensación de desmayo
- Sensación general de cansancio

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo este folleto y haga clic para obtener la Información para el paciente, la Información de prescripción y las Instrucciones de uso.

Hay apoyo económico disponible

UDENYCA Solutions™, parte de la familia de servicios de apoyo Coherus Solutions™, ofrece apoyo a los pacientes a quienes se les receta UDENYCA.

Coherus Solutions™

Working together to ensure patient access



Programa de ahorro de copago

El Programa de ahorro de copago puede cubrir gastos de bolsillo asociados a UDENYCA para pacientes elegibles con seguro comercial†

Pague tan solo \$0 por dosis de UDENYCA con un beneficio anual máximo de \$15,000 por los costos del fármaco por año calendario†



Apoyo de fundaciones independientes

UDENYCA Solutions puede ayudarlo a encontrar apoyo económico mediante fundaciones benéficas, o puede optar por ponerse en contacto directamente con estas fundaciones de asistencia independientes

Pida ayuda en el consultorio del médico para solicitar el apoyo económico de UDENYCA.



ENCUENTRE MÁS DETALLES

sobre el apoyo y la elegibilidad visitando UDENYCASolutions.com, llamando al **1-844-4UDENYCA** (1-844-483-3692) o escaneando este código

† Los pacientes cubiertos por Medicare, Medicaid o cualquier programa federal o financiado por el estado no son elegibles para el Programa de ahorro de copago de Coherus Solutions. El Programa de ahorro de copago SOLO cubre el costo de UDENYCA y no cubre los costos asociados a la visita al consultorio. Los requisitos de elegibilidad, el tipo de asistencia y el proceso de solicitud varían. Se aplican otras restricciones; consulte los Términos y condiciones en UDENYCASolutions.com. El Programa de ahorro de copago está sujeto a cambios o discontinuación sin previo aviso. Este no es un seguro médico.

Consulte la Información importante de seguridad en todo este folleto.

 **UDENYCA®**
pegfilgrastim-cbqv

No está solo en esto

UDENYCA le proporciona recursos y apoyo que lo ayudan a mantenerse en el camino correcto con su tratamiento.



QUÉ ESPERAR DURANTE LA ADMINISTRACIÓN

Haga clic [aquí](#) o escanee el código para ver un video para obtener más información sobre cómo se administra UDENYCA con el inyector corporal y el autoinyector.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de UDENYCA? (continuación)

- **Síndrome mielodisplásico y leucemia mieloide aguda:** si tiene cáncer de mama o de pulmón, cuando UDENYCA se utiliza con quimioterapia y radioterapia, o solo con radioterapia, puede tener un mayor riesgo de sufrir una afección sanguínea precancerosa llamada síndrome mielodisplásico (SMD) o un cáncer de la sangre llamado leucemia mieloide aguda (LMA). Los síntomas del SMD y de la LMA pueden ser cansancio, fiebre y fácil aparición de moretones o hemorragias. Comuníquese con su proveedor de atención médica si presenta estos síntomas durante el tratamiento con UDENYCA.
- **Inflamación de la aorta (aortitis):** se informó inflamación de la aorta (el vaso sanguíneo grande que transporta la sangre desde el corazón hacia al resto del cuerpo) en pacientes que recibieron pegfilgrastim. Los síntomas pueden ser fiebre, dolor abdominal, sensación de cansancio y dolor de espalda. Comuníquese con su proveedor de atención médica si tiene estos síntomas.
- **Estudios por imágenes óseas (estudios por imágenes nucleares):** la formación de determinadas células sanguíneas puede aumentar y asociarse a cambios a corto plazo en los estudios por imágenes óseas. Su médico debe tener en cuenta esto al interpretar los resultados de estos estudios.
- **Alergias a los acrílicos (UDENYCA ONBODY solamente):** El inyector corporal (OBI) de UDENYCA utiliza adhesivo acrílico. Si tuvo reacciones a los adhesivos acrílicos, el uso de este medicamento puede provocar una reacción significativa.

APOYO ECONÓMICO

Es posible que disponga de apoyo económico durante el recorrido de su tratamiento con UDENYCA Solutions, parte de la familia de servicios de apoyo de Coherus Solutions.



Working together to ensure patient access

Los efectos secundarios más frecuentes de UDENYCA son dolor en los huesos, los brazos y las piernas.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de UDENYCA. Comuníquese con su proveedor de atención médica para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios. Para informar POSIBLES REACCIONES ADVERSAS, póngase en contacto con Coherus BioSciences llamando al 1-800-4-UDENYCA (1-800-483-3692) o notifíquelas a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

Lea la [Información para el paciente](#) y la [Información de prescripción](#) de UDENYCA.



Coherus Solutions, UDENYCA Solutions y UDENYCA ONBODY son marcas comerciales, y UDENYCA es una marca comercial registrada de Coherus BioSciences, Inc.

©2024 Coherus BioSciences, Inc. Todos los derechos reservados. US-UDY-0092 04/24